

# DESPRENDIMIENTO EXUDATIVO DE RETINA COMO COMPLICACIÓN DE LA TRABECULECTOMÍA

---

**Sánchez Martínez Daniel, Tudela Molino Miguel, Sellés Navarro  
Inmaculada, Villegas Pérez María Paz, Miralles de Imperial Mora-Figueroa  
Jaime**



# MAVC


Ojo derecho: 20/20  
Ojo izquierdo: 20/25


# PRESION INTRAOCULAR

## Paquimetría



Ojo derecho:  $487 \pm 1,87 \mu\text{m}$   
Ojo izquierdo:  $490 \pm 1,64 \mu\text{m}$

## Gonioscopia (Shaffer):





# PPruébasfuncionaléss



# RESUMEN DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Tres días después de la intervención...

**PRESIÓN INTRAOCULAR CLARAMENTE ELEVADA**  
**PACIENTE** → Lagrimeo ligeramente sanguinolento  
Disminución de agudeza visual a 20/400


**NO RESPUESTA A NINGUNA MEDICACIÓN TÓPICA**

**NO PROGRESIÓN GLAUCOMATOSA**  
**EXPLORACIÓN** → Ampolla bien formada, CABP, hipema mínimo en CA  
PIO (OI): 8 mmHg


**QUERATITIS MEDICAMENTOSA AOS**  
PIO (OI): Desprendimiento exudativo bulloso de retina superior y temporal que afecta a mácula


**TRATAMIENTO CORTICOIDÉO ORAL**

**Retina**



**Coroides**  
**Retina**





**Desprendimiento de retina  
exudativo (DER)**

**Desprendimiento coroideo (DC)**

**DER: Inflamación/~~tumor~~**

**DC: Inflamación/hipotonía**

Quince días después...

... y a la espera de  
operar el ojo derecho



PIO (O  
tipo c  
Dis

ningún  
pico)  
ade

Ar  
ce

U  
al